

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Fase fenologica: Chiusura grappolo BBCH 79

Bollettino di difesa della vite n°10 del 01/07/2020

OIDIO

Le caratteristiche metereologiche di questi giorni estremamente favorevoli allo sviluppo del patogeno, impongono di aggiungere al trattamento liquido

Zolfo bagnabile colloidale alle dosi di etichetta.

Per le aziende che segnalano attacchi su acino si consiglia, prima di eseguire il trattamento, di contattare il servizio tecnico

PERONOSPORA

Le condizioni attuali non favoriscono lo sviluppo del patogeno. Si sono registrate lievi bagnature fogliari che potrebbero causare attacchi nelle foglie più giovani (germogli),

Si consiglia pertanto di mantenere la copertura utilizzando:

Rame Metallo

ATTENZIONE: limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

- Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

Per le aziende che avessero registrato danni da grandine, è possibile utilizzare prodotti a base di **Folpet** alle dosi di etichetta.

E' concesso dalla deroga territoriale del 16/06/2020, alle N.T. 2020 di produzione integrata, l'esecuzione di 5 trattamenti annui COMPLESSIVI con le sostanze attive antiperonosporiche Mancozeb, Folpet, Ditianon e Fluazinam con il limite di 4 trattamenti per Mancozeb, Folpet, Ditianon e 3 per Fluazinam.

Non è più possibile utilizzare Mancozeb, Metiram e Ditianon oltre il 30 giugno.

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Vedi Bollettino dedicato.

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144/356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Fase fenologica: Chiusura grappolo BBCH 79

Bollettino di difesa della vite n°10 FD del 01/07/2020

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

(D.M. del 31/5/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite")

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda l'obbligo di effettuare il 1° trattamento

da Mercoledì 1 luglio a Martedì 7 Luglio

Con uno dei seguenti principi attivi a dosi di etichetta:

Etofenprox (Tempo di carenza 21 gg) **o** **Acetamiprid** (Tempo di carenza 14 gg)

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla distribuzione utilizzando alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro consigliate, acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare. I trattamenti nelle ore serali sono da preferirsi.

ALTRI PRINCIPI ATTIVI AMMESSI NELLE NORME TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA DELLA VITE 2020		
SOSTANZA ATTIVA	Gruppo chimico	Tempo di carenza
Sali potassici di acidi grassi	-	-
Piretrine pure	3A	3 gg
Tau-fluvalinate	3A	21 gg
Acrinatrina	3A	28 gg
Flupyradifurone	4D	14 gg

**Si ricorda che NON E' PIU' POSSIBILE
UTILIZZARE i prodotti contenenti
THIAMETHOXAM (Actara e Luzindo) o
CLORPIRIFOS ETILE/METILE (Pyrinex, Reldan 22,
ecc), EVENTUALI SCORTE
DEVONO ESSERE SMALTITE**

**SANZIONI: CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI
OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A
2.400,00 EURO**

Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi per cui è obbligatorio lo sfalcio completo della vegetazione sottostante prima del trattamento, in caso di fioriture spontanee, anche per le aziende che aderiscono al Bando PSR Misura 10.1.1-Impegno aggiuntivo dell'inerbimento controllato, evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

**DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE)
ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA
FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).**