

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Fase fenologica: Fine fioritura BBCH 69

Bollettino di difesa della vite n°6 del 10/06/2020

PERONOSPORA

Data la fase fenologica delicata e viste le continue bagnature fogliari che persistono nel vigneto, è necessario mantenere la copertura adoperando prodotti ad azione sistemica con retroattività, per poter garantire la massima protezione anche sulle recenti precipitazioni.

Appena le condizioni meteo lo consentiranno trattare con:

Metalaxil-M o Benalaxil o Benalaxil-M (Max 3 Anno x gruppo)
o Cimoxanil (Max 3 Anno x gruppo) **o Dimetomorf** (Max 3 Consecutivi)

Per completare il trattamento si consiglia di aggiungere;

Rame Metallo o **Mancozeb** (Max 3 volte entro il 30/06) o **Metiram** (Max 3 volte entro il 30/06) o **Ditianon** (Max 3 volte entro il 30/06) o **Folpet** (Max 3 volte)

ATTENZIONE: limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

- Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

OIDIO

Non sussistono le condizini per lo sviluppo del patogeno ma per maggior sicurezza è possibile aggiungere alla miscela **Zolfo bagnabile** colloidale alle dosi di etichetta o altro prodotto antioidico di copertura.

INSETTICIDA

Sia per le aziende convenzionali sia per le Biologiche, si raccomanda di attendere i bollettini ufficiali della Regione Piemonte prima di effettuare trattamenti contro lo *Scaphoideus titanus*.

Si ricorda anche che è vietato eseguire tali trattamenti insetticidi durante le fioriture.

Comunicare al servizio tecnico se si notano sintomi di qualsiasi natura, su foglia o su grappolo.

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardanti delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI CULTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI